

MA FICHE MÉMO



Voie veineuse centrale – Voie périphérique

Il est très important de différencier les voies centrales des voies périphériques

Les voies centrales

Ce sont des **dispositifs intravasculaires** dont l'extrémité est à la jonction de la veine cave et de l'oreillette droite. Leur utilisation est fréquente en réanimation, bloc, soins intensifs, USC, hémodialyse et de plus en plus à domicile.

La pose est un **acte médical** au bloc opératoire ou en réanimation avec une **asepsie chirurgicale**, sa position est vérifiée par **imagerie de contrôle**.

Les voies veineuses centrales utilisées à domicile sont :

- Le Picline
- La Chambre à cathéter implantable (CCI)
- Les cathéters tunnelisés (jugulaire, sous-clavière)

Les voies périphériques

Ce sont les abords veineux d'une **veine périphérique** posés par un infirmier ou un médecin (possibilité d'utiliser un échographe dans certains cas)

Cela ne nécessite **pas d'imagerie de contrôle**

Il en existe 2 types :

- La VVP (voie veineuse périphérique)
- Le Midline

Les indications, la pose et la durée des cathéters :

	Voie Périphérique	Voie centrale
Localisation	Veines périphériques	Veines de gros calibres (jugulaire, sous clavières..)
Pose	Par un infirmier ou un médecin pour la VVP Par un IADE/IDE formé à l'écho ou médecin	Médecin
Indications	En 1 ^{ère} intention, médicaments non veino-toxiques, remplissage, transfusion, alimentation parentérale pour voie périphérique.	Chimiothérapies, transfusion, alimentation parentérale, dialyse, médicaments infectieux Capital veineux pauvre
Durée	Traitements < 5jrs pour VVP <4sem pour Midline	Traitements de longue durée (plusieurs mois)



Ne pas confondre un Midline et un Picline car ils sont très ressemblants, ils ont la même insertion : Midline n'est pas une voie centrale