M2 - MALADIES À PRÉVENTION VACCINALE (2)

Infection à papillomavirus - Rotavirus - Fièvre jaune

Infection à papillomavirus

DURÉE MOYENNE D'INCUBATION	POPULATION LA PLUS À RISQUE	PRINCIPAUX SYMPTÔMES	DURÉE DE LA PÉRIODE CONTAGIEUSE (EXCRÉTION)	COMPLICATIONS	FORMES ASYMPTOMATIQUES
Imprécise 1 mois à plusieurs années	Hommes et femmes au début de l'activité sexuelle	Condylomes, Verrues cutanées Papillomatose orale	Aussi longtemps que le virus est présent dans l'organisme	Cancers Col de l'utérus +++ Vagin, anus pénis, gorge	Très fréquente

Rotavirus

DURÉE MOYENNE D'INCUBATION	POPULATION LA PLUS À RISQUE	PRINCIPAUX SYMPTÔMES	DURÉE DES SYMPTÔMES	DURÉE DE LA PÉRIODE CONTAGIEUSE (EXCRÉTION)	COMPLICATIONS	FORMES ASYMPTOMATIQUES
3 jours	Enfants de - 5 ans	Apparition rapide de vomissements et de diarrhées : • Déshydratation rapide • Fièvre modérée	3-7 jours	Pendant la phase symptomatique et jusqu'à 8 jours après la fin des symptômes	Méningites, encéphalites dans de très rares cas Létalité : 0.5-1.6 décès / 1 million enfants	Dans la majorité des cas

Fièvre jaune

DURÉE MOYENNE D'INCUBATION	POPULATION LA PLUS À RISQUE	PRINCIPAUX SYMPTÔMES	DURÉE DES SYMPTÔMES	DURÉE DE LA PÉRIODE CONTAGIEUSE (EXCRÉTION)	COMPLICATIONS	FORMES ASYMPTOMATIQUES
3 à 6 jours	Personnes vivant ou voyageant dans les zones endémiques	Fièvre importante et soudaine, Congestion du visage, qui devient bouffi, Douleurs abdominales et musculaires	3 ou 4 jours	Non contagieuse transmis par les moustiques	Choc avec hypothermie, Ictère et vomissements sanglants, Anurie et protéinurie massive Atteinte hépatique et rénale pouvant entraîner le coma et la mort	Asymptomatique chez de nombreuses personnes

M2 - MALADIES À PRÉVENTION VACCINALE (2)

Rougeole - Oreillons

Rougeole

DURÉE MOYENNE D'INCUBATION	POPULATION LA PLUS À RISQUE	PRINCIPAUX SYMPTÔMES	DURÉE DES SYMPTÔMES	DURÉE DE LA PÉRIODE CONTAGIEUSE (EXCRÉTION)	COMPLICATIONS
10 à 14 jours	Toute personne non immunisée Enfants +++	Rhinite Toux Yeux rouges et larmoyants Petites taches blanches à l'intérieur des joues Asthénie Forte fièvre (39-40°) Éruption	Environ 10 jours	4 jours avant l'apparition des symptômes et 4 jours après	Cécité Encéphalite Diarrhée sévère et déshydratation Infections auriculaires conjonctivites Problèmes respiratoires graves, pneumonies Surinfection bactérienne Grossesse : prématurité et RCIU Décès

Oreillons

DURÉE MOYENNE D'INCUBATION	POPULATION LA PLUS À RISQUE	PRINCIPAUX SYMPTÔMES	DURÉE DES SYMPTÔMES	DURÉE DE LA PÉRIODE CONTAGIEUSE (EXCRÉTION)	COMPLICATIONS	FORMES ASYMPTOMATIQUES
21 jours	Enfant scolarisé Adolescent Jeunes adultes	Fatigue, frisson Céphalée Perte appétit Fébricule Douleurs pharyngées ou rétro-auriculaires Tuméfaction douloureuse des glandes salivaires	8 à 10 jours	2 jours avant à 4 jours après l'atteinte parotidienne	Méningite lymphocytaire Encéphalites Orchite Épididymite ou ovarite Surdité Stérilité Pancréatite	30 à 40% des cas

M2 - MALADIES À PRÉVENTION VACCINALE (2)

Rubéole

DURÉE MOYENNE D'INCUBATION	POPULATION LA PLUS À RISQUE	PRINCIPAUX SYMPTÔMES	DURÉE DES SYMPTÔMES	DURÉE DE LA PÉRIODE CONTAGIEUSE (EXCRÉTION)	COMPLICATIONS	FORMES ASYMPTOMATIQUES
14 à 21 jours	Femme enceinte	Érythème	3 à 5 jours	7 jours avant et 15 jours après	Purpura thrombopénique Otite moyenne Encéphalite Fausse couche Mort fœtale Rubéole congénitale	1/2