

M4 - MALADIES À PRÉVENTION VACCINALE (4)



Varicelle - Zona - Infections invasives à méningocoques

Varicelle

DURÉE MOYENNE D'INCUBATION	POPULATION LA PLUS À RISQUE	PRINCIPAUX SYMPTÔMES	DURÉE DES SYMPTÔMES	DURÉE DE LA PÉRIODE CONTAGIEUSE (EXCRÉTION)	COMPLICATIONS
7 à 21 jours	Nouveau-nés Immunodéficients	Éruption cutanée	20 jours	2 jours avant apparition des boutons jusqu'aux croûtes	Atteinte pulmonaire cérébrale, cardiaque, hépatique Décès Zona

Zona

POPULATION LA PLUS À RISQUE	PRINCIPAUX SYMPTÔMES	DURÉE DES SYMPTÔMES	DURÉE DE LA PÉRIODE CONTAGIEUSE (EXCRÉTION)	COMPLICATIONS
Personne âgée	Éruption cutanée Douleur	2 à 3 semaines	Environ 1 semaine	Douleur chronique Néuralgie Surinfection bactérienne Paralysie Pneumonie Encéphalite Atteinte de la vue Perte auditive AVC

Infections invasives à méningocoques

DURÉE MOYENNE D'INCUBATION	POPULATION LA PLUS À RISQUE	PRINCIPAUX SYMPTÔMES	COMPLICATIONS	FORMES ASYMPTOMATIQUES
1 à 10 jours Souvent - de 4 jours	Enfant 6 mois à 3 ans Adolescent et jeune adulte Immunodéprimé	Fièvre, Céphalées et raideur de la nuque Nausées, vomissements, Photophobie et léthargie Éruption maculopapuleuse ou pétéchiale hémorragique	Méningococcie fulminante Défaillance multiviscérale CIVD Décès	Porteur = réservoir



Infections à pneumocoques

Pneumocoques

DURÉE MOYENNE D'INCUBATION	POPULATION LA PLUS À RISQUE	PRINCIPAUX SYMPTÔMES	DURÉE DES SYMPTÔMES	DURÉE DE LA PÉRIODE CONTAGIEUSE (EXCRÉTION)	COMPLICATIONS	FORMES ASYMPTOMATIQUES
Quelques jours à 1 semaine	Jeunes enfants, Personnes âgées Personnes atteintes d'une maladie chronique Immunodéprimés	Fièvre Asthénie	Variable	Perdure tant que la bactérie présente dans les sécrétions	Otite Sinusite Méningite Bactériémie Surdité Handicap Décès	Oui = porteur sain