M1 - FICHE MÉMO

La maladie d'Alzheimer



- Maladie avec des symptômes discrets : **stade prodroma**l
- Symptômes + sévères : **stade de la démence**

Les différents stades de démence

- Stade léger (MMS > 20) : Démence légère
- Stade modéré (MMS entre 10 et 20) : Perte d'autonomie, besoin d'aides à domicile
- Stade sévère (MMS < 10) : Troubles du comportement importants

Repérage précoce : à quel stade ?

- Stade prodromal
- Démence légère avec MMS > ou = à 20

EN RÉSUMÉ

- **Stade Prodromal :** Atteinte hippocampique avec syndrome amnésique
- **Stade de Démence :** Diffusion des lésions avec troubles cognitifs et comportementaux

Il est primordial de faire un repérage précoce dès le stade prodromal car l'on peut agir !

Le stade prodromal : syndrome amnésique

Les 3 stades de la mémoire épisodique

Objectif du repérage

- Isoler :
  - Trouble de concentration
  - Trouble du vieillissement
  - Trouble de la maladie d'Alzheimer

M1 – FICHE MÉMO

Les signes évocateurs

Signes d'alerte

- Troubles de l'affectivité
- Troubles du comportement
- Troubles de la mémoire
- Troubles du langage

→ Expriment la diffusion des lésions

Problématique

- Beaucoup d'étiologie pour une plainte mnésique
- Besoin de tests simples
- 1 test isole :
  - Maladie d'Alzheimer syndrome mnésique
  - Autres (étapes enregistrement ou de restitution)
- Isoler le trouble du stockage des :
  - Troubles de l'enregistrement
  - Troubles de la récupération